

Studio graphique / Épreuve Interne

Nom	Imutis IBS
Conditionnement	notice
Référence	701562/N-01
Dimension	● 150 x 210 - 35 mm
Carton	
Grammage	g/m ²
Impression	● Black
Fabrication	Labomar
Créa/modif.	Florine
Date	©trenker • 2024-07-02

Trenker
Laboratoires
Avenue Thomas Edison, 32
1402 Thines (Nivelles) • Belgique
T : +32 (0)2 374 02 53
www.trenker.be

150 mm

Imutis IBS

701562/N-01

FR Traitement du syndrome du côlon irritable

Dispositif médical pour le traitement du syndrome du côlon irritable, caractérisé par des douleurs, des ballonnements, des maux d'estomac, des sensations de distension et de gêne abdominale, accompagnés ou non d'une variation de l'aspect des selles et à une altération du transit intestinal (constipation, diarrhée ou alternance des deux).

Par son action protectrice mécanique, Imutis IBS assure une interaction physique avec la muqueuse intestinale. Il crée un film mucoadhésif qui protège la muqueuse du contact avec les substances irritantes, tout en contribuant à éliminer les substances dangereuses en empêchant leur absorption. Par un mécanisme physique, ce dispositif médical aide à adsorber les gaz intestinaux et à éliminer les toxines, en réduisant ainsi les symptômes typiques du syndrome du côlon irritable.

Ce dispositif médical permet de maintenir intacte la barrière épithéliale intestinale et l'équilibre du microbiote intestinal.

INGRÉDIENTS

Polysaccharides de baies de Goji (*Lycium barbarum L.*) et d'Aloès (*Aloe Vera (L.)* Burm. F.), zéolite micronisée (clinoptilolite), *Lactobacillus Plantarum* tyndallisé (contenant du soja, du lait et des dérivés du lait, dont le lactose), huile essentielle de menthe poivrée, cellulose microcristalline, phosphate dicalcique, stéarate de magnésium d'origine végétale, carboxyméthylcellulose sodique réticulée, dioxyde de silicium. Sans gluten.

PRÉSENTATION

30 comprimés sous blister.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Prendre 1 comprimé deux fois par jour, entre ou avant les repas, ou selon les prescriptions de votre médecin ou pharmacien. En cas de douleur aiguë, la dose peut être doublée.

Selon l'intensité de la douleur, il est recommandé de prolonger le traitement de 2 à 6 semaines et de le répéter en cas de réapparition éventuelle des premiers symptômes.

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de portée des enfants. Même si aucun effet secondaire n'est connu, il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants de moins de 12 ans. Dans tous les cas, consultez votre médecin avant de le prendre. Ne pas dépasser la dose de 4 comprimés par jour. Ne pas le prendre en cas d'allergie ou d'hypersensibilité à l'un des ingrédients. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage n'est pas intact ou s'il est endommagé. La date de péremption se réfère au produit emballé intact et correctement conservé.

CONSERVATION

Conserver le produit à température ambiante, dans son emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec.

DISPOSITIF MÉDICAL

FABRICANT

Labomar S.p.A.,
Via N. Sauro 35 I,
Istrana (TV), Italie

DISTRIBUTEUR

S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE • 1402 Thines • Belgique

Révision : Mars 2021



NL Behandeling van prikkelbare darmsyndroom

Medisch hulpmiddel voor de behandeling van prikkelbare darmsyndroom, dat wordt gekenmerkt door pijn, zwelling, buikpijn, een opgeblazen gevoel en andere buikklachten, al dan niet gepaard met variaties in uitzicht van de stoelgang en een verstoorde darmentransit (constipatie, diarree of afwisseling van beide).

Door zijn mechanische beschermende werking zorgt Imutis IBS voor een fysieke interactie met het darmslijmvlies. Het creëert een mucoadhesieve film die het slijmvlies beschermt tegen contact met irriterende stoffen en tegelijkertijd gevaarlijke stoffen helpt te weren door de absorptie ervan tegen te gaan. Door middel van een fysiek mechanisme helpt het darmgassen te adsorberen en toxines te verwijderen, waardoor de typische klachten van prikkelbare darmsyndroom worden verminderd.

Het middel helpt de darmepitheelbarrière intact te houden en het evenwicht van de darmmicrobiota te bewaren.

BESTANDDELEN

Polysacchariden van Goybessen (*Lycium barbarum L.*) en Aloë (*Aloe vera (L.)* Burm. f.), gemicroniseerd zeoliet (clinoptiloliet), getyndalliseerde *Lactobacillus plantarum* (bevat soja, melk en melkderivaten waaronder lactose), etherische pepermuntolie, microkristallijne cellulose, dicalciumfosfaat, plantaardig magnesiumstearaat, gecrosslinkte natriumcarboxymethylcellulose, siliciumdioxide. Glutenvrij.

PRESENTATIE

30 tabletten in blisterverpakking.

Trenker
laboratoires

210 mm

35 mm

36 mm

34 mm

34 mm

36 mm

35 mm

POSOLOGIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

Neem 2 keer per dag 1 tablet tussen of voor de maaltijden, of volgens advies van uw arts of apotheker. Bij acute pijn kan de dosis worden verdubbeld.

Afhankelijk van de intensiteit van de aandoening wordt aanbevolen de behandeling te verlengen van 2 tot 6 weken en te herhalen indien de eerste symptomen terugkeren.

WAARSCHUWINGEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Ook al zijn er geen bijwerkingen bekend, wordt het afgeraden het product te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding en bij kinderen jonger dan 12 jaar. Raadpleeg in elk geval uw arts voordat u het inneemt. De dosis van 4 tabletten per dag niet overschrijden. Neem het middel niet in als u allergisch of overgevoelig bent voor één van de bestanddelen. Gebruik het product niet na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Niet gebruiken als de verpakking niet intact is of beschadigd. De uiterste gebruiksdatum heeft betrekking op het ongeopende, verpakte product dat op de juiste manier is bewaard.

BEWARING

Bewaar het product bij kamertemperatuur in de originele, goed afgesloten verpakking op een koele en droge plaats.

MEDISCH HULPMIDDEL

FABRIKANT

Labomar S.p.A.,
Via N. Sauro 35 I,
Istrana (TV), Italië

VERDELER

N.V. Farmaceutische Laboratoria Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE • 1402 Thines • België

Herziening: Maart 2021



DE Behandlung des Reizdarmsyndroms

Medizinprodukt zur Behandlung des Reizdarmsyndroms, das durch Schmerzen, Schwellungen, Bauchschmerzen, Blähungen und Bauchbeschwerden gekennzeichnet ist, die mit oder ohne Veränderung des Stuhlaussehens und einer gestörten Darmpassage (Verstopfung, Durchfall oder abwechselnd beides) einhergehen.

Dank seiner mechanischen Schutzwirkung bewirkt Imutis IBS eine physikalische Wechselbeziehung mit der Darmschleimhaut und bildet eine an der Schleimhaut anhaftende Schicht, die die Schleimhaut vor dem Kontakt mit Reizstoffen schützt und gleichzeitig hilft, gefährliche Substanzen durch Wirkung gegen deren Absorption zu entfernen; durch einen physikalischen Mechanismus trägt es zur Adsorption von Darmgasen, zur Ausscheidung von Giftstoffen und somit zur Reduzierung der typischen Störungen des Reizdarmsyndroms bei.

Das Medizinprodukt hilft, die intakte Darmepithelbarriere und das Gleichgewicht der Darmmikrobiota zu erhalten.

INHALTSSTOFFE

Polysaccharide aus Goji (*Lycium barbarum L.*) und Aloe (*Aloe Vera (L.)* Burm. F.), mikronisiertes Zeolith (Klinoptilolith), tyndallisierter *Lactobacillus Plantarum* (es enthält Soja, Milch und Derivate, einschließlich Laktose), ätherisches Pfefferminzöl, mikrokristalline Zellulose, Dicalciumphosphat, pflanzliches Magnesiumstearat, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Siliziumdioxid. Glutenfrei.

PRÄSENTATION

30 Tabletten in einer Blisterpackung.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Nehmen Sie zweimal täglich 1 Tablette zwischen oder vor den Mahlzeiten oder gemäß Erachten des Arztes oder Apothekers ein. Bei akuten Schmerzen kann die Dosierung verdoppelt werden.

Je nach Intensität der Beschwerden wird empfohlen, die Behandlung von 2 bis 6 Wochen zu verlängern und bei

einem möglichen Wiederauftreten der ersten Symptome zu wiederholen.

WARNHINWEISE

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Auch wenn keine Nebenwirkungen bekannt sind, wird empfohlen, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit und für Kinder unter 12 Jahren zu verwenden. In jedem Fall sollten Sie vor der Einnahme Ihren Arzt befragen. Überschreiten Sie nicht die Dosis von 4 Tabletten pro Tag. Nehmen Sie es nicht ein, wenn Sie allergisch oder überempfindlich auf einen der Inhaltsstoffe reagieren. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum. Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung nicht unversehrt oder beschädigt ist. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das verpackte, unversehrte und ordnungsgemäß gelagerte Produkt.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Produkt in der ordnungsgemäß verschlossenen Originalverpackung, bei Raumtemperatur an einem kühlen und trockenen Ort

MEDIZINPRODUKT

HERSTELLER

Labomar S.p.A.,
Via N. Sauro 35 I,
Istrana (TV), Italien

VERTREIBER

S.A. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker
Avenue Thomas Edison 32
BE • 1402 Thines • Belgien

Überarbeitete Fassung: März 2021



7FGL00232800

Trenker
laboratoires

Pliage

36 mm

1 mm

